



Blomstrende robinie. (ES).

Robinie, *Robinia pseudoacacia*

Højt træ med store fannede blade, torndannede akselblade og hvide, vellugtende blomster i hængende klaser; bælggen er smal og fladtrykt. Hjemmehørende i nordøstlige Amerika, almindeligt prydtræ i haver og parker, hist og her i skove og plantager.

Ærtetræ 1779, akacie, -træ 1787ff, med blade og torne ligner robinien den ægte akacie; bælgtrø 1790–1843, bønnenetræ 1796–1866 (1).

Robinien blev i sidste halvdel af 1700-t forsøgt indført i skovbruget, fra den tid stammer spredte forekomster i vore skove; ved Alholm Lolland står et eksemplar ca. 25 meter højt og 5 meter omkring stammen (1916; 2). Første omtale af opformeringen stammer fra 1802 (Erholm på Fyn og Store Hedinge; 3), den anbefales 1806 som pryd- og gavntræ (4), giver tømmer, stæn-

ger, pæle, godt brændsel, gode hegn (1790; 5), veddet anvendtes meget til skibsnagler (7), egner sig til pæle, grubeved, bådebygning og møbler, men uagtet skovkultur blev forsøgt fra tid til anden, er den nu praktisk taget opgivet (7):

Som økonomisk forsøg med akaciens titel du kom her, - pralede, fandt behag, skrantede, glemtes igen. J. H. Smidth 1823 (8).

LITTERATUR: (1) 689 2,448; (2) 622b 120; (3) 653 1,228f; (4) 398 1806,679; (5) 194 3,193; (6) 510 5,57; (7) 950 179; (8) 842 177.

Vikke, *Vicia*

Slægten er i den danske flora repræsenteret af ca. 15 arter. De ligefinnede blade ender i en bråd eller slyngtråd, de røde, violette eller lilla blomster sidder parvis eller i kase.

Vikke o. 1450ff (wickæ) er måske over tysk wicke beslægtet med slægtsnavnet *Vicia*, grundbetydningen kan være 'tynd, bøjelig' (om stænglerne); i stednavne: Vikkebjerg 1772ff Als, Vikkeland 1837 Gram Sønderjylland, måske i Vikkergårde 1683ff Møgeltønder. Fugleært 1546, fuglevikke 1715ff; Lolland, Bornholm, blå perler VHanherred o. 1880 (1).

FODERVIKKE, *Vicia sativa*, bliver 30–60 cm høj, de enlige eller parvise blomster med violet fane og røde vinger sidder i bladhjørnerne, bælggen er lysebrun og dunhåret. Alm. dyrket, forekommer desuden som sædukrudt.

Kornvikke 1622–o. 1700, hestevikke 1622–1859, vikke 1769–o. 1870; Jylland, sort vikke og dansk vikke 1831, visse sorter har sorte frø, sødvikke 1840–90, vintervikke 1877–1919 (2).

MUSEVIKKE, *Vicia cracca*, klatrer indtil meterhøjt og er almindelig i krat, på gærder, i korn etc.; violette, nikkende blomster i oprette klaser. Musevikke 1793ff nedsættende ligesom fuglevikke begyndelsen af 1500-t ff; øerne; skovvikke 1688, rød vikke 1678; fugleært 1678–o. 1880 (Øjylland, Angel), museært o. 1700–o. 1885; Jylland, dyrenavnet betegner noget mindreværdigt i forhold til haveært, de små frø har ringe værdi som føde og foder; polsk vikke 1778–1877 vel nedsættende om ukrudtet ligesom polakker 1793; sammenfletning(er) 1806 om plantens vækst i korn, hanevikke Salling o. 1870, klavrer Thy o. 1870, musetræppe Jylland o. 1880, småbladene sidder parallelt og kan på klatrende stængler minde om stige, trappetrin eller tænder: kukkerkam NFyn o. 1880, kam og kornkam