

## Søanemone, *Metridium senile*, *Metridium dianthus*

Søanemone 1803ff, *sønellike* 1770ff, *sønælde* 1776ff; midtskiven med talrige tætstillede tynde fangarme på en 15-20 cm lang glat krop giver dyregruppen lighed med dobbelte franske anemoner eller nelliker (1): De pragtfulde søanemoner vi ser på bropælene, hvor deres orangegule, røde og hvide fangarme breder sig ud som strålelende blomsterkroner J.O. Bøving-Petersen (2), søanemonen flimrer kry · med mangefarvet skæg Erik Bertelsen (3).

Andre sammenligninger: *stud*; *studerøv* NSjælland, *korøv*; *pitte* Dråby NSjælland, *hestepit*; *nosse* Sejerø; *søborre* Korsør, *sørv* (4).

Færøerne: *sjónota* 'sønælde'; Grønland: *kitupe-rak*.

LITTERATUR: (1) 659 23, 246; (2) 119 112; (3) 56e 41; (4) 202c 4,96; 76b 2,96; 388.

## Regnorme, *Lumbricidae* Sandorm, *Arenicola marina*

Der lever 19 arter REGNORM i Danmark, den største er den 20-25 cm lange *Lumbricus terrestris*.

SANDORMEN bliver 15-20 cm, på dens tykke for-krop sidder lange børster, på midten har dyret røde gællebuske, kroppens bagerste tredjedel er tynd og halelignende. Ved alle lavvandede sand-bundskyster.

– Danmarks Dyreverden 1, 163-65, 185ff.

Regnorm, ældre nydansk d.s.; kommer efter lang-varig regn frem til overfladen (på grund af iltman-gel), omvendt mente man det blev regnvejr, når regnormene viste sig, sml. s. 22 (1).

Jordorm (iorthorm) o. 1300ff; NSjælland (2). Maddike (madkæ) 1300-t ff (3), Bornholm 1700-t ff (4), s.f. Åbenrå (maig), ØJylland, Vendsyssel, NFyn (5), jordmaddike, -mak 1622-1800-t (6).

Sandorm graver sin gang i havbunden. BIOFOTO/Svend Tougaard.

