

ANVENDELSE

Hæg er god til at plante ved strømbredder for at fastholde jorden (1790; 1).

Grenene har været benyttet til piberør, piskeskafter m.m. (2), og da »toppen er lige så sei som roden«, foretrækkes de og unge stammer af bødkere til karringe og tøndebånd (3). Vedet kan anvendes til snedker-, drejer- og sløjdarbejder samt trækul, men har ingen større værdi (4).

Inderbarken farver grønt (5), med jernvitriolgrå nuancer (6).

Bladene virker adstringende og har været anvendt som erstatning for kinabark (2), dekokt af inderbarken kan læge skab (7). Hæg indgår i middel for hestens blodpis (8).

Om halsen på husdyr plaget af lus hænges en krans af sammenflettede hæggrene (9), dyret vaskes med afkog af barken (Jylland; 10); bærrene fordriver lus o.a. utøj hos køer og kalve (Grensten ved Gudenåen 1686; 11). – Blade og blomsterklaser lagt mellem korn i laden holder mus og rotter borte (12).

Der kan af frugterne brygges en slags frugtvin (13); de spises rå, med mælk eller syltet (Assing VJylland o. 1900; 14).

En ung smuk hæg blev pyntet som »pinsemaj« (VSlesvig; 15) se Røn bd. 3.

Hægen har blomster, ak, kender du duften? · Duften fra lykkens og længslernes tid, · brisen har båret den hid. · Brisen, som bærer den over dit hår, · kom fra vor kærligheds vår *Ludvig Holstein* (16).

Jørgen Bukdahl, Når hæggen blomstrer i Norge (17).

Rødder og 4–5-årige skud af hæg bruges til tøndebånd. Tegning af Lorenz Frölich til H. C. Andersens eventyr »Flyttedagen«.



LITTERATUR: (1) 194 3,209; (2) 398 1806,467 og 1821,536; (3) 830 12,41; 950 177; (4) 599b 1,611; 950 177; (5) 576 4,1799,405; (6) 525b 15; (7) 696 1761,336; (8) 83 174; (9) 1008 4,1916,595 (1771); 398 1806,467; (10) 942 26; (11) 258 1943,150; (12) 451b 58 (1793); 398 1806,467; (13) 597 93; (14) 634 19088; (15) 228e 2,830; (16) 397b 62f; (17) 414 16/5 1941.

Tornblad, *Ulex europaeus*

er en lav, meget forgrenet og tornet vintergrøn busk med smalle og trinde tornspidsede blade og gule blomster. På sandjord, men temmelig sjælden og ikke oprindeligt vildtvoksende her i landet.

Tornblad 1793ff; *jordpren* o. 1700–1820, *torgyvel* 1758 (tornefuld gyvel), Tunø 1917; *søsiv* 1768, *kristtorn* MFyn slutningen 1800-t, *Kristi tornekrone* Als o. 1870, iflg. legende udpeget som leverandør til tornekronen; *rævetorn* Grenåegnen, *fandens sengehalm* Himmerland, *havstørn* Bornholm, *junetorn* Kerte Fyn vist navnelån fra hunderose (1).

Frø fra Oldenburg bliver 1725 sået på Tisvilde-egnen til levende hegning mod sandflugten; planten anbefales som hegning på diger o.l. (2) og såes i dyrehaver til hjortefoder om vinteren (3), nu undertiden som vildtskjul. 1856 foreslåes, at man prøvedyrker tornblad i egne med mager jordbund, navnlig i Jylland og på Fyn (4), de ituhakkede og knuste unge grene og blade kan om vinteren bruges som grønfoder til heste, kvæg og svin (5).

Den tørrede plante er anvendelig som brændsel (6).

LITTERATUR: (1) 689 2,754–61; (2) 263 1907,11; 194 3,197; (3) 784 270; 510 6, 52; 145 1899,231; (4) 916 3,4, 160–63; (5) 274 1,1889,28 og 1891,27f jf. 512 22,1889,341; (6) 398 1806,657 og 1821,757.

Visse, *Genista*

FARVE-VISSE, *Genista tinctoria*, bliver 20–40 cm høj, har lancetformede blade og i grenspidserne gule blomsterklaser. Alm. i Jylland i lyngheder, på bakker, ved veje, sjælden på øerne.

Visse 1686ff, MJylland 1795, Mors 1811, Thy o. 1870, navnet beslægtet med gammeldansk vase = risknippe (jf. visk) og gjaldt i 1600-t gyvel, men fra 1793 denne botaniske slægt; måske i stednavnet Vissenbjerg 1383ff Fyn. *Gul-*